

BON USAGE DES FORMES ORALES SECHES

Ecrasement des comprimés et ouverture des gélules

La décision de modifier la galénique d'un médicament ne doit pas être prise à la légère étant donné les risques potentiels associés (erreurs de dosage, risques de toxicité ou de perte d'efficacité). Il faut considérer les caractéristiques physico-chimiques, pharmacocinétiques et/ou pharmacodynamiques du médicament ainsi que l'état clinique du patient; le but final étant d'améliorer la compliance au traitement tout en maintenant une bonne biodisponibilité.

Voici quelques règles de bases :

- **Comprimés simples, non enrobés**

Peuvent être écrasés.

- **Comprimés pelliculés, filmés ou dragées**

La pellicule ou l'enrobage sucré sont destinés à améliorer la présentation, faciliter la déglutition, masquer l'odeur ou le goût, améliorer la stabilité, faciliter la manipulation (critères de confort et de marketing)

Peuvent être écrasés.

- **Comprimés effervescents**

Facilite la prise et permet l'administration de grandes quantités de principe actif
A diluer dans de l'eau.

- **Capsules ou gélules dures**

Pour les principes actifs qui se prêtent mal à la compression
Peuvent être ouvertes.

- **Capsules en gélatine molle**

Contiennent souvent des médicaments liquides huileux. S'il n'y a pas d'alternative (forme liquide, comprimés effervescents) ils peuvent éventuellement être dissoutes dans un peu d'eau tiède (lipophile !) ou percées avec une aiguille pour récupérer le contenu (imprécis et souvent visqueux !)

- **Comprimés orodispersibles**

Facilite la prise, car dissolution par la salive, mais absorption intestinale identique aux comprimés simples.

Fondent sur la langue et sont avalés avec la salive.

Peuvent être dilués dans un peu d'eau (ne pas écraser).

- **Comprimés sublinguaux**

Conçus pour une absorption par la muqueuse buccale.

Fondent sous la langue. Ne doivent pas être avalés (inefficacité).

Ne doivent pas être écrasés ou dilués.

- **Formes gastro-résistantes**

Résistent au suc gastrique et se désagrègent dans l'intestin (forme gastrorésistante ou entérosoluble) pour protéger le principe actif ou la muqueuse de l'estomac.

Ne doivent pas être écrasés ou ouvertes (capsules).

- **Comprimés ou capsules avec microgranules gastro-résistants**

Peuvent être dilués dans un peu d'eau (ouvrir les capsules : ne pas écraser les microgranules).

- **Formes à libération modifiée**

Systèmes pharmaceutiques permettant une libération contrôlée (différée, plus régulière et/ou plus longue) du principe actif.

Ne doivent en général pas être écrasés.

- **Formes retard ou à libération modifiée**

Ne doivent pas être écrasés ou ouvertes (capsules).

Médicaments particuliers :

- Médicaments à faible marge thérapeutique (anticoagulants oraux, anticonvulsivants, digoxine, etc.) : risque de sous-dosage ou surdosage cliniquement significatif
- AINS et substances irritantes : attention risque d'effets secondaires pour le patient
- Médicaments anticancéreux par voie orale : ne pas écraser ou couper.

Recommandations

- Généralité

- Si le patient ne peut pas avaler les comprimés, les formes **liquides** (solutions, suspensions, émulsions, sirops, gouttes, etc.) ou les **comprimés effervescents** doivent être préférées aux formes solides. Vérifier que les formes solides considérées peuvent être coupées ou écrasées (*référentiel CH Montauban ci-dessous*).
- Ne pas couper ou pulvériser des comprimés à l'avance. Les principes actifs peuvent être instables à l'air, à l'humidité ou à la lumière.

- Prescription

- Limiter la prescription aux médicaments indispensables.
- Chercher des alternatives galéniques (solution buvable, cp oro-dispersible...), ou des alternatives thérapeutiques médicamenteuses (principe actif équivalent avec galénique adéquate) ou non médicamenteuses à l'écrasement du médicament.
- Identifier le motif d'écrasement et le renseigner sur la fiche de prescription.
- Contacter la pharmacie pour les médicaments nécessitant des précautions particulières pour la préparation ou pour trouver une alternative thérapeutique.

- Préparation

La préparation doit être assurée par une infirmière.

- Toujours vérifier si le médicament est écrasable en se référant à la liste.
- Laver les mains avant et après la manipulation.
- Ecraser les médicaments le plus finement possible et administrer les médicaments un à un.
- Ecraser le médicament immédiatement avant de l'administrer. Sinon refaire la préparation.
- Ne pas écraser plusieurs comprimés en même temps
- Le mortier et le pilon ou le système de broyage devront être nettoyés entre chaque médicament, laver le matériel à l'eau et savon après chaque administration.

Référentiel CH Montauban



Gélules que l'on peut ouvrir



Gélules à ne pas ouvrir



Comprimés que l'on peut écraser



Comprimés à ne pas écraser



Formes orales que l'on peut dissoudre dans un verre d'eau

PA : Principe Actif

Pk : Pharmacocinétique

En l'absence de référentiel préexistant, les recommandations présentes résultent d'une recherche bibliographique et documentaire menée auprès des laboratoires pharmaceutiques dans le but d'améliorer les pratiques et de limiter les risques pour les malades et les soignants.

*Bien souvent les comprimés peuvent être écrasés si on se place d'un point de vue galénique mais les laboratoires n'ayant pas fait d'études pharmacocinétiques ne garantissent pas la bioéquivalence, ceci est précisé dans la colonne « **remarques** ». Ces recommandations seront affinées en fonction des remarques et propositions faisant suite à leur mise en pratique.*

Cette liste n'est pas exhaustive et sera réactualisée périodiquement.

ANNÉE 2010-2012

| | |
|---------------------------|------------------|
| CARDIOLOGIE | PAGE 6-8 |
| PSYCHIATRIE | PAGE 9-11 |
| GASTRO-ENTEROLOGIE | PAGE 12 |
| NEUROLOGIE | PAGE 13 |
| ENDOCRINOLOGIE | PAGE 14 |
| ANTALGIE-ANALGESIE | PAGE 15 |
| ANTI INFECTIEUX | PAGE 16 |
| DIVERS | PAGE 19 |

MEDICAMENTS CARDIOLOGIE

| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--|
|  | Adalate 10mg gel | Nifédipine | |
|  | Aldactazine 25mg cp | Spironolactone + Altizide | |
|  | Aldactone 25mg et 50mg | Spironolactone | |
|  | Aldomet 250mg cp | Méthyl dopa | Sensible à l'oxydation |
|  | Alpress LP 2,5mg cp | Prazosine | |
|  | Amlodipine 5mg gel | (Amlor) | |
|  | Aprovel 150 mg cp | Irbésartan | |
|  | Atacand 8 mg cp séc cp | Candésartan | |
|  | Aténolol 100mg et 50mg cp | (Ténormine) | |
|  | Avlocardyl LP 160mg gel | Propranolol | |
|  | Bisoprolol 10mg cp | (Détensiel) | |
|  | Burinex 1 et 5mg cp | Bumétanide | |
|  | Captopril 25 et 50mg cp | (Lopril) | |
|  | Cardensiel 1,25, 2,5 et 5mg cp | Bisoprolol | |
|  | Céliprolol 200mg cp | (Célectol) | Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études Pk effectuées. Possible si pas d'autres alternatives |
|  | Chronadalate LP 30mg cp | Nifédipine | |
|  | Cipralan 130 mg cp séc | Cibenzoline | Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études Pk effectuées. Possible si pas d'autres alternatives |
|  | Coaprovel 150mg/12,5mg cp | Irbésartan + HTZ | |
|  | Cordarone 200mg cp | Amiodarone | |
|  | Corvasal 4mg cp | Molsidomine | Utilisation immédiate car principe actif photosensible |
|  | Coumadine cp | | Pas de problème d'un point de vue galénique mais produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose |

















Centre Hospitalier
de Montauban

| | | | |
|---|--|------------------------|---|
|  | Cozaar 50mg cp | Lozartan | |
|  | Esidrex 25mg cp | Hydrochlorothiazide | |
|  | Eupressyl 30mg gél | Urapidil | Ne pas broyer les micro-granules |
|  | Flécaïne LP 100mg et LP 50mg gél | Flécaïnide | Ne pas broyer les micro-granules |
|  | Fludex LP 1,5mg cp | Indapamide | alternative esidrex |
|  | Hémigoxine 0,125mg | Digoxine | Pas de problème d'un point de vue galénique mais produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose |
|  | Hypérium 1mg cp | Rilménidine | |
|  | Hytacand 8mg/12,5mg cp | Candésartan + HTZ | |
|  | Ikorel 10mg CP | Nicorandil | |
|  | Inspra cp | Eplérénone | |
|  | Isoptine 120 mg gel | Vérapamil | Prise avec repas |
|  | Isoptine 40mg cpr | Vérapamil | Prise avec repas |
|  | Isoptine LP 240mg gel | Vérapamil | |
|  | Lasilix 20mg, 40mg cp | Furosémide | Utilisation immédiate car principe actif photosensible |
|  | Lisinopril 5 et 20mg | (Zestril) | |
|  | Lisinopril et hydrochlorothiazide 20/12,5mg | (Zestoretic) | |
|  | Loxen 20mg cp séc | Nicardipine | Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études Pk effectuées |
|  | Loxen LP 50 mg gél | Nicardipine | Ne pas broyer les micro-granules |
|  | Modurétic 5mg/50mg cp | Amiloride + HTZ | |
|  | Monicor LP 20mg gel | Isosorbide mononitrate | |
|  | Monotildiem LP 200et 300mg | Diltiazem | |
|  | Nimotop cp | Nimodipine | |
|  | Nimotop cp | Nimodipine | |



Centre Hospitalier
de Montauban

| | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|
|  | Périndopril 2 et 4mg cp séc | (Coversyl) | |
|  | Preterax 4mg cp | Périndopril + Indéпамиде | |
|  | Previscan cp | Fluindione | Pas de problème d'un point de vue galénique mais produit à marge thérapeutique étroite, attention à la dose |
|  | Rasilez 150 et 300mg | Aliskiren | Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études Pk effectuées |
|  | Rénitec 5mg et 20mg cp séc | Enalapril | PA hydroscopique et photosensible |
|  | Rythmol 300mg cp séc | Propafénone | |
|  | Sectral 200mg, 400mg cp | Acébutolol | |
|  | Sotalol 80mg cp | Sotalol | |
|  | Tareg 80 et 160mg cp | Valsartan | Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études Pk effectuées |
|  | Tildiem 60mg cp | Diltiazem | |
|  | Tildiem 60mg cp | Diltiazem | |
|  | Trandate 200mg cp | Labétalol | |
|  | Triatec 2,5mg cp séc | Ramipril | |
|  | Zanidip 10mg cp | Lercandipine (Lercan) | PA photosensible |













MEDICAMENTS PSYCHIATRIE

| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|------------------------------------|------------------------|--|
|  | Abilify 10mg,15mg cp ORODIS | Aripiprazole | |
|  | Alprazolam 0,25mg cp | (Xanax) | |
|  | Aricept 5 et 10mg orodisp | Donézépil | |
|  | Atarax cp | Hydroxyzine | Utiliser la forme buvable |
|  | Buspirone 10mg | (Buspar) | |
|  | Clomipramine 10 et 25mg cp | (Anafrani)l | |
|  | Clomipramine 75mg | (Anafranil) | Encapsulage du PA qui modifie la libération. |
|  | Clozapine 25mg,100mg cp séc | (Léponex) | |
|  | Cymbalta 30 et 60mg cp | Duloxétine | |
|  | Dépakote 250 et 500 mg cp | Divalproate de sodium | |
|  | Dépamide 300mg cp | Valpromide | Comprimés gastro-résistant |
|  | Déroxat 20mg cp séc | Paroxétine | |
|  | Dipipéron cp séc | Pipampérone | Utiliser la forme buvable à 40mg/ml |
|  | Dogmatil 200mg cp | Sulpiride | |
|  | Dogmatil 50mg gel | Sulpiride | |
|  | Ebixa 10 et 20mg cp | Mémantine | Utiliser la forme buvable |
|  | Exelon 1,5, 3 et 6mg gel. | Rivastigmine | Utiliser le patch |
|  | Floxyfral 100mg cp séc | Fluvoxamine | |
|  | Haldol toutes formes | Halopéridol | Utiliser la forme buvable à 2mg/ml |
|  | Imovane 3.75mg cp | Zopiclone | |
|  | Ixel 50mg gé | Milnacipran | |













| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|---------------------------------------|------------------------|---|
|  | Largactil cp | Chlorpromazine | |
|  | Laroxyl cp | Amitryptiline | Utiliser la forme buvable |
|  | Lexomil 6mg cp séc | Bromazépam | |
|  | Loxapac 50mg cp | Loxapine | Utiliser la forme buvable |
|  | Ludiomil 25mg,75mg cp séc | Maprotiline | |
|  | Lysanxia 10mg cp | Prazépam | Utiliser la forme buvable |
|  | Miansérine 10mg, 30mg, 60mg cp | (Athymil) | |
|  | Mirtazapine 15mg cp | (Norset) | Possible d'un point de vue galénique mais pas d'études Pk. PA photosensible, utiliser de préférence la forme buvable à 15mg/ml |
|  | Moditen 25 et 100mg cp | Fluphenazine | |
|  | Mogadon 5mg cp | Nitrazépam | Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études PK |
|  | Neuleptil 25mg cp | Propériciazine | |
|  | Normison 20mg | Témazépam | |
|  | Nozinan toutes formes | Lévomépromazine | |
|  | Piportil cp | Pipotiazine | Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études PK. PA photosensible. Utiliser de suite. Possibilité de la sol buv à 4% |
|  | Prozac 20mg cp orodisp | Fluoxétine | |
|  | Reminyl LP 8mg, 16mg gel. | Galantamine (aricept) | Ne pas écraser le micro granules |
|  | Risperdal 0,5 et 2mg cp oro | Rispéridone | |
|  | Séresta 10mg, 50mg cp séc | Oxazépam | |
|  | Séroplex cp | Escitalopram | |
|  | Séropram cp | Citalopram | Utiliser la forme buvable à 40mg/ml |
|  | Sertraline 50mg gél | (Zoloft) | Pas d'étude de PK |
|  | Solian cp | Amisulpride | Utiliser la forme buvable à 100mg/ml |



Centre Hospitalier
de Montauban

| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|  | Stablon cp | Tianeptine | |
|  | Stilnox 10mg cp | Zolpidem | |
|  | Surmontil 100mg cp | Trimipramine | Utiliser la forme buvable |
|  | Témesta 1mg,2,5mg cp séc | Lorazépam | |
|  | Téralithe 250mg cp séc | Carbonate de lithium | |
|  | Téralithe LP 400mg | Carbonate de lithium | |
|  | Tercian cp | Cyamémazine | Utiliser la forme buvable |
|  | Tranxène toutes formes | Clorazépate dipotassique | |
|  | Urbanyl 5 et 20mg cp et gel | Clobazam | |
|  | Valium cp | Diazépam | Utiliser la forme buvable à 1% |
|  | Venlafaxine 37,5 et 75 mg | (Effexor) | Ne pas écraser le micro granules |
|  | Zyprexa velotab | Olanzapine | |

MEDICAMENTS GASTRO-ENTEROLOGIE




| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|--|------------------------|--|
|  | Azantac 300mg cp eff | Ranitidine | |
|  | Cytotec 200µg cp | Misoprostol | Utiliser la forme buvable |
|  | Dompéridone 10mg cp | (Motilium) | Enrobage gastro-résistant, utiliser la forme buvable |
|  | Emend 80 et 125mg gél | Aprépitant | |
|  | Inexium 20 et 40mg cp dispersible | Esoméprazole | Bien agiter |
|  | Lopéramide 2mg gél | Imodium | PA photosensible. Utiliser la forme buvable ou la forme lyophilisat oral |
|  | Phloroglucinol orodisp | (Spasfon Lyoc) | |
|  | Primpéran 10mg cp | Métoclopramide | Utiliser la forme buvable |
|  | Trimébutine 100mg cp | (Débridat) | |
|  | Ursolvan gel | Ac Ursodéoxycholique | Peu soluble dans l'eau |
|  | Vogalène 7,5 mg lyoc | Métopimazine | |
|  | Zophren 8mg cp oro | Ondansétron | |

MEDICAMENTS NEUROLOGIE

| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|---|-------------------------|---|
|  | Akineton LP 4mg cp | Bipéridène | |
|  | Alepsal 50mg cp | Phénobarbital + caféine | Difficile à écraser |
|  | Artane 2 et 5mg cp | Trihexiphénidyle | Utiliser la forme buvable à 0.4% |
|  | Dépakine chrono 500mg cp séc | Ac. Valproïque | Remplacer par micropakine sachet |
|  | Di Hydan 100mg cp | Phénytoïne | |
|  | Epitomax 25mg gel | Topiramate | |
|  | Gardenal cp | Phénobarbital | |
|  | Keppra 500mg cp | Lévétiracétam | Pas de problème d'un point de vue galénique mais attention car index étroit. Possibilité d'utiliser la forme orale à 100mg/ml |
|  | Lamotrigine 25, 100mg cp dispers | (Lamictal) | |
|  | Lepticur 10mg cp | Tropatépine | |
|  | Lyrica 25, 75 et 150mg gel | Prégabaline | |
|  | Modopar LP 125 gel | L Dopa + Bensérazide | |
|  | Modopar 62.5,125,250 gel | L Dopa + Bensérazide | |
|  | Modopar 125 cp pour sus buv | L Dopa + Bensérazide | Prendre, autant que possible, ½ heure avant ou 1heure après un repas |
|  | Neurontin 100mg et 400mg gel | Gabapentine | Goût amer |
|  | Neurontin 600mg cp | Gabapentine | Goût amer |
|  | Parkinane LP 5mg gel | Trihexiphénidyle | |
|  | Parlodel 10mg gel | Bromocriptine | |
|  | Parlodel 2,5mg cp | Bromocriptine | |
|  | Rivotril 2mg cp séc | Clonazépam | Utiliser la forme buvable |
|  | Sabril 500mg cp | Vigabatrin | Utiliser granule pr sol buvable à 500mg |



Centre Hospitalier
de Montauban

| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|
|  | Sinemet 100mg/10mg cp | L Dopa + Carbidopa | |
|  | Tegretol 200mg cp | Carbamazépine | Attention car médicaments à index thérapeutique étroit. Possibilité d'utiliser la forme orale à 20mg/ml |
|  | Tegretol LP 400mg cp | Carbamazépine | Attention car médicaments à index thérapeutique étroit. Possibilité d'utiliser la forme orale à 20mg/ml |
|  | Trileptal 300mg cp | Oxcarbazépine | Utiliser la forme buvable |
|  | Zomigoro 2,5mg cp | Zolmitriptan | |

MEDICAMENTS ENDOCRINOLOGIE

| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | Bévitine 250mg cp | Vit B1 | |
|  | Calcidose vit D DISPER | Calcium + vit D | |
|  | Crestor 5mg,10 mg cp | Rosuvastatine | |
|  | Fosavance cp | Ac. alendronique/colecalciferol | |
|  | Fumafer 66mg cp | Fumarate ferreux | |
|  | Glimépiride 2mg cp | (Amarel) | |
|  | Glucophage 1000mg, 850mg cp | Metformine | Goût désagréable |
|  | Glucor 100mg cp | (Acarbose) | |
|  | Gliclazide 30 LM cp | (Diamicon) | |
|  | Januvia 100mg cp | Sitaglipine | Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études Pk effectuées. Goût amer |
|  | Levothyrox | L-thyroxine | Utiliser immédiatement |
|  | Lipanthyl 160mg gél | Fenofibrate | |
|  | Novonorm 0,5mg et 1mg cp | Répaglinide | |
|  | Omacor caps | Oméga 3 polyinsaturée | |
|  | Pravastatine 20mg cp | (Elisor, Vasten) | |
|  | Questran sac | Colestyramine | |
|  | Tahor 10mg,40mg cp | Atorvastatine | |
|  | Vitamine B1/B6 cp | Vit B1 et vit B6 | |

MEDICAMENTS ANTALGIQUES-ANALGESIQUES





| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|--|------------------------|---|
|  | Actiskénan tous dosages gel | Morphine | |
|  | Advil cp | Ibuprofène | Goût amer. Utiliser immédiatement. Préférer la solution buvable à 20mg/ml |
|  | Biprofenid LP 100mg cp | Kétoprofène | |
|  | Dafalgan 500mg cp eff | Paracétamol | |
|  | Dafalgan 500mg gel | Paracétamol | |
|  | Dafalgan codéine cp efferv | Paracétamol + codéine | |
|  | Dafalganhop 1gr cp effev | Paracétamol | |
|  | Dicodin 60mg LP cp | Dihydrocodéine | |
|  | Ibuprofène 200mg cp | Ibuprofène | Possible mais goût amer. Préférer la forme buvable à 20mg/ml |
|  | Ixprim 325/37,5mg cp | Tramadol + paracétamol | Utiliser le comprimé effervescent |
|  | Nifluril 250mg gé | Ac. Niflumique | Utiliser la forme suppo |
|  | Oxycontin LP tous dosages cp | Oxycodone | |
|  | Oxynormoro tous dosages cp orodisp. | Oxycodone | |
|  | Skénan LP tous dosages gel | Morphine | Attention de ne pas écraser les micro granules |
|  | Sophidone 4mg, 8 mg LP et 16mg LP gel | Hydromorphone | |
|  | Topalgic 50mg gel | Tramadol | |
|  | Topalgic LP 100 et 150mg cp | Tramadol | Utiliser la forme buvable à 100mg/ml |
|  | Voltarène LP 75 et LP 100mg cp | Diclofénac | |
|  | Voltarène 50mg cp | Diclofénac | Forma gastro-résistante. Utiliser la forme suppo |

MEDICAMENTS ANTI INFECTIEUX

| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|--|-------------------------------------|---|
|  | Adiazine 500 mg, cp | Sulfadiazine | Goût amer |
|  | Amox-Ac clav 1 g/125 mg pdr pr susp buv, sachet | Amoxicilline et inhibiteur d'enzyme | |
|  | Amox-Ac clav 500 mg/62.5 mg, cp | Amoxicilline et inhibiteur d'enzyme | Utiliser la pdre pour susp buvable |
|  | Bactrim forte cp | Sulfamethoxazole et Trimethoprime | Utiliser la forme liquide. 1 cuill. Mesure = 200mg/40mg |
|  | Birodogyl cp | Spiramycine en association | |
|  | Bristopen 250 mg/5 mL, pdr pr sirop | Oxacilline | |
|  | Cefixime 200 mg cp | Cefixime | |
|  | Ciprofloxacine 500 mg cp | Ciprofloxacine | |
|  | Clamoxyl 1g cp disper | Amoxicilline | |
|  | Dalacine 300 mg gél | Clindamycine | |
|  | Doxycycline 100 mg cp | Doxycycline | |
|  | Erythrocline 1 000 mg, granulés sachet | Erythromycine | |
|  | Flagyl 250 mg, cp | Metronidazole | Préférer la suspension buvable à 125mg/5ml |
|  | Fluconazole 200mg gél | Fluconazole | |
|  | Fucidine 250 mg cp | Acide Fusidique | Utiliser la susp buvable 250mg/5ml |
|  | Furadantine 50 mg gél | Nitrofurantoine | |
|  | Izilox 400 mg cp | Moxifloxacine | PA photosensible |
|  | Ketek 400 mg cp | Telithromycine | Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études Pk. PA très amer. |
|  | Myambutol 400mg cp | Ethambutol | |
|  | Noroxine 400 mg, cp | Norfloxacine | |
|  | Ofloxacine 200 mg cp | Ofloxacine | Utiliser de suite car la PA est photosensible |

| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Remarques |
|---|---|---|--|
|  | Oracilline 1 Miu cp | Phenoxymethylpenicilline | Utiliser la susp buvable 1M UI/10ml |
|  | Oracilline 500 000 iu/5 mL, susp buv | Phenoxymethylpenicilline | |
|  | Orbénine 500 mg gél | Cloxacilline | |
|  | Pirilène 500mg cp | pyrazinamide | |
|  | Pyostacine 500 mg cp | Pristinamycine | Goût amer |
|  | Rifadine 300mg gél | Rifampicine | PA coloré. utiliser susp buvable |
|  | Rifater cp | Rifampicine + isoniazide + pyrazinamide | |
|  | Rifinah cp | Rifampicine + isoniazide | *Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études Pk |
|  | Rimifon 50, 150 mg cp | Isoniazide | |
|  | Rovamycine 3 Miu cp | Spiramycine | |
|  | Roxithromycine 150 mg cp | Roxithromycine | Utiliser le cpr pour susp buvable à 50mg |
|  | Rulid 50mg cp pr susp buv | Roxithromycine | |
|  | Tamiflu 30, 75 mg gél | Oseltamivir | Goût amer |
|  | Tavanic 500 mg cp | Levofloxacin | Utiliser de suite car la PA est photosensible |
|  | Valacyclovir 500mg cp | (Zelitrex) | Pas de problème d'un point de vue galénique mais pas d'études Pk. Goût amer. |
|  | Vfend 200mg, 50mg cp | Voriconazole | Privilégier la susp buvable |
|  | Zeclar 250 mg cp | Clarithromycine | Goût amer |
|  | Zithromax 250 mg, cp | Azithromycine | Utiliser la forme buvable 40mg/ml |
|  | Zovirax 200mg cp | Acyclovir | *Possible mais préférer la forme buvable |
|  | Zyvoxid 600 mg cp | Linezolid | |
| | | | |

MEDICAMENTS DIVERS

| | MEDICAMENTS REFERENCES | DCI CORRESPONDANTES | Alternatives |
|---|----------------------------|--------------------------|--|
|  | Nicobion 500 mg, cp | Vitamine PP= vitamine B3 | |
|  | Finasteride 5mg cp | (chibro-proscar) | La personne qui écrase le comprimé ne doit pas être enceinte. Port de gant obligatoire |
|  | Xatral LP cp | Alfuzozine | |
|  | Anandron 150mg cp | Nilutamide | La personne qui écrase le comprimé ne doit pas être enceinte. Port de gant obligatoire |

Bibliographie

Doucet G. Le goût des médicaments écrasés ou liquides: un facteur souvent négligé. *Québec Pharmacie*, 2002; 49: 124-6.

CAPP-INFO, Pharmacie des HUG (Hôpitaux universitaires de Genève).

Monographie du Vidal édition 2010

Thériaque

Comedims Poitou Charentes

Pharmacie Hospitalière Française n° 118, 1996, pp 180-196

Centre hospitalier d'Arpajon – Service Pharmacie - Bonnes pratiques d'administration des formes orales sèches

Livret d'utilisation des médicaments par voie orale - CHU Clermont Ferrand - avril 2003

Laboratoires Pharmaceutiques

« Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé » AFSSAPS – juin 2005